

Bestimmungshilfe für Amphibien und Reptilien in Stuttgart

Amphibien mit Schwanz:

Feuersalamander	ca.20 cm, <u>schwarz</u> mit <u>gelben</u> (bis orangenen) Flecken
Bergmolch	8-11 cm, Grundfarbe schwärzlich oder bläulich, Bauch kräftig orange bis rot und ungefleckt, ♂ im Frühjahr an den Flanken mit schwarz-weißer Punktierung und mit gelb ♀ schwarz gemustertem Rücken dunkelgrau bis schwarz marmoriert und mit schwacher Flankenpunktierung
Teichmolch	9,5-11 cm, Grundfarbe gelblich oder bräunlich, Bauch gelb bis orange, dunkle Punktierung ♂ im Frühjahr mit gewelltem Rücken ♀ schwächere Färbung und kleinere Tupfen
(Kammolch)	14-18 cm, schwarz-braun, orangener Bauch, dunkle Flecken, an den Flanken weiße Punktierung, ♂ im Frühjahr mit gezacktem Hautkamm)
(Fadenmolch)	ähnlich Teichmolch, kleiner, ♂ mit Faden am Schwanzende)

Amphibien im ausgewachsenen Zustand ohne Schwanz:

Gelbbauchunke	5 cm (wie kleine Kröte), Haut warzig, gelb-schwarz gefleckte Bauchfärbung
(Laubfrosch)	5 cm, glatte Haut, Oberseite grasgrün oder variabel, Unterseite weißlich-gekörnt, seitlich mit schwarzem Streifen)
Erdkröte	bis 15 cm, gedrungen, Färbung hell- bis dunkelbräunlich oder oliv mit warziger Haut, ♂ kleiner als ♀
(Wechselkröte)	7-9 cm, warzige Haut, grünes Fleckenmuster auf heller Oberseite)
Grasfrosch	bis 10 cm, sehr unterschiedliche Färbung (bräunlich, ocker, oliv, rötlich, gelblich), Oberseite oft mit dunklen Flecken, an den Hinterbeinen Längsstreifen, Schläfenfleck
Springfrosch	fast wie Grasfrosch, schlanker, mit längeren Hinterbeinen, Bauchseite ungefleckt
Teich-/	variable überwiegend grüne Färbung mit dunkler unregelmäßiger Fleckung. Lautes
Wasserfrosch	Quaken im Frühjahr und Sommer.
(Seefrosch)	17 cm, groß, plump, olivgrün bis bräunlich gefärbt, warzige Haut)
<u>Reptilien:</u>	
Zauneidechse	20-25 cm, ♂ <u>grünlich</u> , ♀ bräunlich, <u>gedrungener Kopf</u> , <u>dunkel-hell-gemusterte Streifen</u> auf dem Rücken
Wald- oder	14-16 cm, hell- bis dunkel <u>braun</u> , <u>spitzer Kopf</u> , Reihen dunkler und heller Punkte auf dem Rücken, Unterseite hell
Bergeidechse	
Mauereidechse	bis 20 cm, <u>zierlich</u> , mit spitzem Kopf und langem Schwanz, <u>gräuliche oder bräunliche</u> Färbung, gefleckt oder mit Netzmuster auf dem Rücken. Unterseite heller
Blindschleiche	bis 50 cm, <u>glänzend glattschuppig</u> , <u>grau bis kupferfarbig</u> ,
Ringelnatter	meist bis 1 m (auch bis 160 cm), <u>grau</u> gefärbt mit weißlicher Unterseite und gelben Flecken an den Seiten des Hinterkopfs
Schlingnatter	bis 70 cm, Färbung <u>gräulich bis bräunlich</u> mit kleinen dunklen <u>Flecken</u> , großer dunkler Nackenfleck und Augestreif, Unterseitendunkel.

Vorkommen in Stuttgart:

häufig und/oder verbreitet	selten und/oder versteckt lebend	(fast ausgestorben)
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------